




兒童疫苗接種時程懶人包



四合一疫苗:預防疾病為白喉、百日咳、破傷風、小兒麻痺
 五合一疫苗:預防疾病為白喉、百日咳、破傷風、B型嗜血桿菌、小兒麻痺
 B肝球蛋白:母親為高傳染性B型肝炎帶原者(e抗原陽性)新生兒



嬰幼兒預防接種時間試算



兒童疫苗常見 6種副作用



高燒超過 38°C



注射部位反應



疲倦



頭痛



腹瀉



噁心

疫苗是增強兒童免疫系統的重要工具。不過疫苗和其他藥物一樣，都有可能引發副作用，是免疫系統對疫苗產生反應的一種正常現象。大多數副作用是輕微和短暫的，通常在幾天內就會消失。



全民愛健康
麻疹篇2

麻疹的高危險群



圖文創作：健談 havemary.com
專家諮詢：弘森診所 吳書毅醫師



1 未曾接種麻疹疫苗，或不具抗體者



2 未達接種年齡，或未按時接種疫苗之幼兒



3 醫護人員

接種MMR疫苗是預防麻疹最好的方法



4 計畫前往麻疹流行區域者



5 頻繁接觸外國旅客者

MMR疫苗是麻疹、腮腺炎、德國麻疹的混合疫苗，接種2劑其保護力可達97%



麻疹相關問題，建議諮詢『小兒科、家醫科』

更多資訊請上 健談 havemary.com

疾病管制署衛教影音區



麻疹主要症狀

初期症狀像感冒，別輕忽

HEHO



潛伏期7~18天

持續3~5天

持續3~7天

病毒接觸



症狀出現



發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、口腔內膜出現斑點

紅疹出現

病情最嚴重



紅疹出現並擴散耳後>臉部>全身
發疹前後4天是傳染期

紅疹消退



紅疹、熱度慢慢消退。皮膚留下黑色沉澱

預防麻疹這樣做

1 接種MMR疫苗

可使95%以上的人產生主動免疫

(嬰幼兒可按照常規預防接種時程接種疫苗)



2 保持良好的個人衛生



疑似麻疹症狀
請戴口罩
立刻就醫

腸病毒輕症

3-7天

輕症常見症狀為**泡疹性咽峽炎**以及**手足口病**，伴隨3-5天發燒，主要問題為無法進食可能引發脫水



咽喉潰瘍



皮膚紅疹



手掌水泡



腳掌水泡

腸病毒重症

高燒超過五天，出現**四大重症前兆**需要注意



嗜睡



肌躍型抽搐



心搏過速



持續嘔吐

出現重症前兆任何一種儘速送到**醫學中心**或**專責醫院**



還有還有....

333法則



小於3歲



高燒39度



超過3天

= 重症機率



資料來源:<https://twkid.com/p/1441/>



協力演出

Artso 亞梭傢俬

腸病毒消毒撇步

一般環境消毒

0.05% 泡製方式

酒精/乾洗手
對腸病毒
無消毒功能

100cc 漂白水 + 10公升 清水
免洗湯匙5匙 1250cc, 寶特瓶8瓶

嘔吐物/排泄物污染

1% 泡製方式

200cc 漂白水 + 10公升 清水
免洗湯匙10匙 1250cc, 寶特瓶8瓶



它躲在四處

腸病毒非小孩專利

大人也要注意!

無論大人或小孩若出現以下症狀，極有可能是腸病毒：

- 1 喉嚨 口腔黏膜破損
- 2 喉嚨嚴重疼痛 有如刀割
- 3 拉肚子
- 4 輕微發燒 (38度左右)
- 5 手腳出現紅疹 (通常是細小的紅疹，剛開始不容易察覺)

如有疑似症狀請及早就醫治療，並做好個人防護，降低家人朋友感染的機會!

注意!! 腸病毒

掌握黃金治療時間

症狀



積極預防期 1



處理方式



2 輕症期

加強免疫 三加一



關鍵時期 父母加強照顧

3 重症期

重症前兆



處理方式



腸病毒重症醫療網
新竹市2家責任醫院：
兒童醫院、新竹台大

預防新生兒腸病毒防治

傳染途徑



常見症狀



重症症狀



預防方法

- 孕婦產前14天至分娩，應注意自身健康狀況
- 返家接觸孩童前，洗手更換乾淨衣物
- 照顧者要勤洗手，做好個人衛生習慣
- 孕婦及新生兒儘量不要接觸疑似病患

新生兒感染腸病毒種類

- * 伊科病毒
- * 克沙奇B型病毒